

重要な情報が記載されていますので、必ずお読み下さい。

令和 4 年 4 月 - 5 月

金沢市久安 3 丁目 406 番地  
製造販売元 **辰巳化学株式会社**

名古屋市天白区古川町 125 番地  
販売元 **本草製薬株式会社**

勃起不全治療剤

# タダラフィル錠 10mgCl「TCK」 タダラフィル錠 20mgCl「TCK」

《タダラフィル錠》

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和 4 年 4 月付でタダラフィル錠 10mgCl「TCK」及びタダラフィル錠 20mgCl「TCK」の「使用上の注意」の改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

### ■ 改訂箇所

~~~~~ 自主改訂による変更箇所

| 改 訂 後                                                                                      |                                                                                                         |                                                 | 改 訂 前                                                                                |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>【使用上の注意】</b><br>3. 相互作用<br>現行の通り<br>(1) 併用禁忌 (併用しないこと)<br>現行の通り<br>(2) 併用注意 (併用に注意すること) |                                                                                                         |                                                 | <b>【使用上の注意】</b><br>3. 相互作用<br>省略<br>(1) 併用禁忌 (併用しないこと)<br>省略<br>(2) 併用注意 (併用に注意すること) |           |         |
| 薬剤名等                                                                                       | 臨床症状・措置方法                                                                                               | 機序・危険因子                                         | 薬剤名等                                                                                 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| (現行の通り)                                                                                    |                                                                                                         |                                                 | (省略)                                                                                 |           |         |
| バルイシグア<br>ト                                                                                | 症候性低血圧<br>を起こすおそ<br>れがある。治<br>療上の有益性<br>と危険性を十<br>分に考慮し、<br>治療上やむを<br>得ないと判断<br>された場合に<br>のみ併用する<br>こと。 | 細胞内 cGMP<br>濃度が増加し、<br>降圧作用を増<br>強するおそれ<br>がある。 |                                                                                      |           |         |

なお、他の項は現行の通りとする。

## ■ 改訂理由

相互作用相手薬記載との整合

改訂内容につきましては、令和4年6月発行予定の「医薬品安全対策情報(DSU)No.308」に掲載されます。また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ(<https://www.tatsumi-kagaku.com/>)及び独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)に掲載されますので、併せてご利用下さい。なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ<sup>®</sup>」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧頂くことが可能です。



(01)14987334307070