

本草製薬

麦門冬湯

びくもんどうとう

3g×9包

1000円

エキス顆粒

たんの
きれにくい咳

乾燥したのどに潤い
を与え、咳を鎮めます。

MONDO

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

ばく もん どう とう
漢方製剤 **麦門冬湯エキス顆粒**

第2類医薬品

麦門冬湯は、咳や痰に効く漢方処方です。

咳や痰は、かぜやぜんそく等に伴っておきますが、その原因となった病気や、炎症の程度、体質等によって、様々なタイプがあります。痰の咯出量の多い咳、水様性の痰を伴う咳、濃厚な痰を伴う咳、痰がねばってきれにくい咳、空咳などがあります。

ニタンダ麦門冬湯エキス顆粒は、痰のきれにくい咳や気管支炎、気管支ぜんそく等に効果があります。痰は少ないが咳がはげしくでるという方、のどに乾燥異常感があり、痰がきれにくいという方、痰がきれにくくしわがれ声になるという方、また、かぜなどの病後、熱は下がったが時々はげしい咳がでるという方に適応します。

また、本剤中に麦門冬湯エキスが、現在厚生労働省で認められている最大量配合されています。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水様性の痰の多い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（からぜきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(裏面もお読み下さい)

H803-17

〈成分・分量〉

1日量3包(9g)中に麦門冬湯乾燥エキスが4.4g含まれています。

バクモンドウ ……	10g
ハンゲ ……	5g
コウベイ ……	5g
タイソウ ……	3g
ニンジン ……	2g
カンゾウ ……	2g

より抽出。

添加物としてセルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖を含有する。

〈効能・効果〉

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からせき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回、食前又は食間、なるべく空腹時に服用して下さい。

食間とは…食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回
7～14歳	2／3包	
4～6歳	1／2包	
2～3歳	1／3包	
2歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないで下さい。

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、原料の相違により、顆粒の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地
電話：052-892-1287 (代表)
受付時間：9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
電話0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売元

本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地

製造販売元

二反田薬品工業株式会社

広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号