



一般用医薬品・要指導医薬品 詳細表示

項目	内容						
医薬品区分	一般用医薬品						
薬効分類	葛根湯						
承認販売名							
製品名	本草葛根湯シロップ						
製品名(読み)	ホンゾウカッコントウシロップ						
製品の特徴							
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。</p> <p>■相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。 (4)胃腸の弱い人。 (5)発汗傾向の著しい人。 (6)高齢者。 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (8)次の症状のある人。 むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品の外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>[関係部位:症状] 皮膚:発疹・発赤、かゆみ 消化器:吐き気、食欲不振、胃部不快感</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>[症状の名称:症状] 偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。</p> <p>3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品の外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>						
効能・効果	かぜの初期症状(発熱、寒気、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)						
効能関連注意							
用法・用量	<p>次の量を1日3回食間に服用してください。</p> <p>[年齢:1回量:1日服用回数] 大人(15歳以上):1本:3回 15歳未満:服用しないこと</p>						
用法関連注意	定められた用法・用量を厳守してください。						
成分分量	<p>3本(90mL)中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葛根湯軟エキス</td> <td>8.3g</td> <td>(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	葛根湯軟エキス	8.3g	(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)
成分	分量	内訳					
葛根湯軟エキス	8.3g	(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)					

添加物	白糖, D-ソルビトール, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, 安息香酸ナトリウム, パラベン, 香料(トメントール)
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
消費者相談窓口	本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 会社名: 本草製薬株式会社 住所: 〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地 問い合わせ先: お客様相談室 電話: 052-892-1287(代表) 受付時間: 9:00～17:00(土・日・祝日を除く。)
製造販売会社	大生堂薬品工業(株)岐阜市六条大溝3丁目3番17号
販売会社	本草製薬(株) 添付文書情報: J0601008867_04_B.pdf
剤形	液剤
リスク区分	第2類医薬品